



عوارض عمل های لاغری چیست؟

بکشی و لاغرم کن!

حالا که کم کم به آخر سال و عید نوروز نزدیک می شویم، همه به فکر لاغر شدن افتاده اند و بساط رژیم و کلاس های ورزشی داغ است، اما عمل های زیبایی لاغری هم همیشه طرفدار داشته است. همین عمل های جراحی اما عوارض زیادی دارد، عوارضی که گاهی به لاغر شدن دو، سه ساله اش نمی آرد. جراحی کاهش وزن نمی تواند رفتار شما را تغییر دهد، یعنی اگر شما عادات خود را عوض نکنید و همچنان زیاد بخورید، مطمئناً وزن از دست داده را دوباره باز خواهید یافت.

لیلا شوقی

روزنامه نگار

۶۶

تحقیقات جدید نشان داده جراحی های کاهش وزن، به مرور تاثیر خود را از دست می دهند و وزن شما که قبلاً کاهش پیدا کرده، دوباره اضافه می شود

بای پس معده به روش انحراف بلیوپانکراتیک توسط duodenal switch

در این روش پیچیده و چند بخشی حدود ۸۰ درصد معده تان حذف می شود و فقط لوله ای که غذا را در روده کوچک آزاد می کند به همراه بخش محدودی از روده کوچک که معمولاً به معده وصل است باقی می ماند.

عوارض

- سوء تغذیه و کمبود ویتامین
- مشکلات ریوی یا تنفسی
- عفونت و استفراغ
- بیهوشی
- خونریزی بیش از حد
- واکنش غیرطبیعی به
- افت قند خون
- ابتلا به فتق

بای پس معده به روش Roux-en-Y

این روش شایع ترین عمل بای پس معده است. این نوع جراحی معمولاً بازگشت پذیر نیست و در آن قسمت بالای معده را می برند و باقی مانده معده را می بندند که باعث می شود در یک وعده، غذای زیادی نخورید و حتی مقدار جذب غذا نیز کاهش می یابد. قسمت باقی مانده اندازه یک گردو است و تنها ۲۸ گرم غذا را در خود نگه می دارد.

عوارض

- فقر مواد غذایی یا سوء تغذیه
- عدم جذب ویتامین ها که باعث کمبود ویتامین های B۱۲ و D می شود
- ابتلا به سندرم دامپینگ که باعث جراحی مجدد می شود
- ابتلا به فتق
- ابتلا به سنگ صفراوی

جراحی لاغری پلیکاسیون معده

در این عمل به روش لاپروسکوپی طول معده تان را به صورت دامن روی هم پلیسه می زنند تا فضای معده را تنگ کنند؛ بنابراین معده شما کوچک می شود و شما نمی توانید غذای زیادی میل کنید.

عوارض

- باتوجه به این که هیچ بخشی از معده تان بریده نمی شود، در نتیجه امکان نشت داخل شکمی و خونریزی بسیار کم است و اگر مشکلی پیش بیاید با باز کردن پلیسه مشکل ایجاد شده
- در ۱۵-۱۰ درصد موارد پس از ۵ سال و به دنبال پر خوری زیاد، معده تان تا حدودی بزرگ و پلیسه ها هم از یکدیگر فاصله می گیرند و احتمال افزایش وزن دوباره هم به وجود می آید.

لاپاراسکوپی باندینگ شکمی

جراح باندی قابل باد کردن را دور بالاترین بخش معده تان قرار می دهد. وقتی این باند، باد می شود، معده را فشرده می کند؛ درست مانند کمربندی که شلوار را جمع می کند. این کار باعث تقسیم معده به دو قسمت می شود. یک قسمت به صورت پلاستیکی کوچک است و توسط کانالی که توسط باند ایجاد شده با دیگر بخش های معده در ارتباط است. قسمت کوچک باعث می شود مقدار غذای دریافتی تان محدود شود.

عوارض

- بازگشت چاقی در صورت مصرف شیرینی فراوان
- عفونت حلقه که در صورت بروز، باید حلقه از طریق لاپاراسکوپی خارج شود.
- تهوع و استفراغ در صورت پر خوری
- مشکلات محل تنظیم باند در زیر پوست

عمل لیپوساکشن (لیپوپلاستی)

لیپوساکشن یک روش جراحی زیبایی است که با زدن بریدن چربی های اضافه تان، باعث تغییر شکل مناطق خاصی از بدنتان می شود. لیپوساکشن با استفاده از لوله کوچک (کانول) و از جنس استیل انجام می شود.

عوارض

- کبودی و عفونت
- آسیب رساندن به اعصاب، رگ های خونی، عضلات و ریه ها
- عوارض قلبی و ریوی
- تجمع مایع در زیر پوست
- نیاز به عمل جراحی مجدد و ترمیمی
- ناهمواری یا شلی پوست

جراحی بای پس روده (جابه جایی دوازدهه)

در این روش بعد از انجام عمل اسلیو معده، دوازدهه (روده اثنی عشر) و آخرین بخش روده کوچک تقسیم و حدود سه چهارم روده کوچک تان بریده می شود. حالا بخش بالایی روده کوچک که آنزیم های پانکراس و صفرا را حمل می کنند به آخرین بخش متصل می شوند. در این حالت شما غذای کمتری مصرف می کنید؛ چون حفره معده نمی تواند غذای بیشتری در خود نگه دارد. از آنجا که آنزیم های پانکراس و صفرا در انتهای روده کوچک با هم ترکیب می شوند، کالری کمتری جذب بدنتان می شود. عوارض آن کمبود ویتامین ها و مواد معدنی است.

عمل لاغری گاسترکتومی یا اسلیو

تحقیقات جدید نشان داده جراحی های کاهش وزن، به مرور تاثیر خود را از دست می دهند و وزن شما که قبلاً کاهش پیدا کرده، دوباره اضافه می شود. در پی این بازگشت وزن دیابت نیز دوباره سر جای خود باز می گردد. در واقع، اولین سال بعد از عمل گاسترکتومی آستینی، ۷۷ درصد از اضافه وزن بدنتان کم می شود، اما در طول پنج سال وزن کاهش یافته دوباره، باز می گردد. در طول عمل گاسترکتومی آستینی، جراحان بیشتر قسمت های معده را برمی دارند و از قسمت های باقیمانده معده تان، یک لوله درست می کنند. این کاهش سایز معده مقدار غذایی را که شما می توانید بخورید محدود می کند. حذف بیشتر قسمت های معده تان باعث تغییر در هورمون های روده، کاهش اشتها و کاهش قند خون می شود.

عمل لیپوماتیک (پیکر تراشی)

عمل لیپوماتیک، روشی پیچیده برای تخلیه چربی های موضعی بدن است. این چربی ها بدون درد و خونریزی از بدنتان حذف می شوند. هدف، کاهش سایز است. همچنین دقیق تر از روش لیپوساکشن عمل می کند.

عوارض

- سوراخ شدن اعضای داخلی بدن
- عفونت و التهاب
- آمبولی ریه و ورم ریوی
- واکنش آلرژیک
- سوختگی پوست
- کبودی پوست

عمل ابدومینوپلاستی (جراحی زیبایی شکم)

در این عمل چربی و پوست های اضافه از شکمتان حذف می شود و عضلات قسمت شکم را تنگ و صاف می کنند.

عوارض

- باقی ماندن اثر زخم
- شل شدن پوست
- بی حسی در پوست
- آمبولی ریه
- مرگ