

درد بیضه در کودکان را جدی بگیرید

اورژانس‌های با اهمیت اولویّی در کودکان محسوب می‌شود. زیرا همان طور که می‌دانید در صورت چرخیدن بینضه، فرستن طلایی برای اصلاح و جلوگیری از نابودی پیشه صرف‌آشیش ساعت است. لذا توصیه می‌شود در صورت بروز درد ناگهانی در بینضه کودک خود، بدون فوت وقت و به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه کنید.

از علل دیگر درد پیشه در این سنین می‌توان به التهاب و عفونت بافت بینضه و محاری اسپیم بر اشاره کرد که معمولاً منشأ آین عفونت، میکروب‌های ادراری است. در این موارد معاینه پزشک و انجام آزمایش ادرار و گاهی عکسبرداری را دارای اولویّی‌ترین اهمیت دارد.

یک از علول دردهای بیضه در این رده سنی ضریبه به بیضه است که معمولاً به صورت غیرعمدی و حین باری رخ می‌دهد. شدت درد در این موارد زیاد است ولی اغلب کوتاه‌مدت و گذراست. لذا در صورت گذرابودن در در این موارد جای نگرانی نیست. ولی اگر درد افزایش یابنده بود یا منجر به تورم، خونریزی بالتهاب و قرمزی در ناحیه تناسلی شد، حتماً لازم است از سوی پزشک معاینه صورت پذیرد. زیراگاهی به دنبال ضربات شدیدی، بافت بیضه متلاشی شده، خونریزی می‌کند و می‌تواند به آسیب جدی و دائمی بیضه منتهی شود. علت دیگر دردهای بیضه در این رده سنی، می‌تواند فتق کشاله ران باشد. همان‌طور که می‌دانید فتق کشاله ران در اوایل دوره کودکی ناشی از اختلال در سیر تکاملی نزول بیضه از داخل شکم به کیسه بیضه است. همچنین در نوجوانان، علت بروز فتق می‌تواند ضعف عضلات جدار شکم باشد. در این موارد با ورود استطلاوهای شکمی، روده‌ها و سایر محتویات شکمی وارد کانال اینگونه‌نیان یا همان کشاله ران شده و گاه تا کیسه بیضه هامتداد می‌یابد و باعث ایجاد بزرگی و برجستگی غیرمعمول در کیسه بیضه می‌شود که این اختلال با ایجاد در در بیضه همراه است. در این موارد لازم است پزشک کودک را معاینه کند و در صورت تأیید تشخیص، تحت حراج اصلاح‌آفته قرار گیرد.

دست پردازی مسح خواه روزگار نیز می‌باشد.
علل دیگری برای دردهای بیضه در سنتین بالاتر
مطرح است که می‌توان به اولیکوسل یا گاهی
توده‌های بیضه اشاره کرد که نیازمند بررسی دقیق
است. با وجود مواد فوق، بروز دردهای خفیف و
گزرا در بیضه‌ها اغلب علت مشخص و مهمی
ندارد و نیازمند اقدام خاصی نیست. با این حال
برای رسایر علل بالاهمیت، لازم است حداقل یک
نویت از سوی برشک معانه انجام شود. 

مواد قندی اضافی برای قلب مضر است



طبق نتایج یک مطالعه جدید، مصرف بیش از حد مواد قندی و شکر می‌تواند موجب تجمع چربی در اطراف قلب و شکم شود. سویون یی، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه مینه‌سوتا در اینباره گوید: «وقتی ما بیش از اندازه مواد قندی مصرف می‌کیم میزان اضافی آن تبدیل به چربی شده و ذخیره

از رفلکس پاید پترسیم؟

رفلاکس شاید از نظر خیلی های بیماری پیچیده و نگران کننده‌ای نباشد. ولی شامل علائمی است که در صورت وجود آنها حتماً باید بررسی های لازم برای تشخیص بیشتر انجام شود. اگر سابقه سرطان معدد در اعضای درجه یک خانواده را دارید، اگر در هنگام قورت دادن غذا احساس سختی و درد می‌کنید، اگر در سه ماه اخیر بیشتر از ۱۰ دقیقه وزن بدون علت داشتید، اگر بی اشتها هستید، اگر کم خونی فقر آهن دارید، اگر مکرر استفراغ می‌کنید، اگر بیشتر از یک تا ده سال در گیرابن بیماری هستید، اگر خونریزی گوارشی داشتید و بالای ۴۵ سال سن دارید، حتماً به متخصص رجوع کنید. خیلی وقت ها فرد، بیماری قلی دارد ولی فکر می‌کند رفلاکس دارد، پس حواستان به قلب تان هم باشد.

چرا بعد از غذا خوردن، سر معده مان می‌سوزد؟ طب سنتی برای این پرسش پاسخ‌هایی دارد

دردسرهای ترش کردن



دکتر پارسا:
سرفه‌های مکرر
یکی از علائم
رفلاکس است و
خیلی از مواردی
که برای سرفه‌ها
علت خاصی پیدا
نمی‌شود بادرمان
رفلاکس التیام
می‌یابد

تحقیقات نشان داده است بیماری کووید-۱۹ علاوه بر اختلالات تنفسی می‌تواند مشکلات متعدد دیگری از جمله اختلالات گوارشی نیز ایجاد کند. تقریباً این ویروس علائم بسیاری از بیماری‌ها را تقلید می‌کند. اما در مورد این که اختصاص این ویروس با علائم رفلاکس معدده خود را نشان دهد، بعید است در این خصوص بررسی و تحقیقاتی انجام شده باشد و در حال حاضر نمی‌توان بدون شواهد یا پژوهشی جامع در این مورد اظهار نظر کرد.

۲- رفلاکس با سوزش یا بدون سوزش

بیماری رفلاکس معدده، ناشی از باگشست غیرطبیعی محتویات معدده به مری است. این بیماری که علامت اصلی آن سوزش سر دل است، به واسطه عوامل آناتومیک و عملکردی نارسایی در چه تھاتانی مری رخ می‌دهد. سوزش سر دل که بیشتر در بالای شکم وزیرسینه حس می‌شود، گهگاه سبب تیرکشیدن پشت جناغ هم می‌شود. سوزش سر دل، از علائم رفلاکس است اما فردی می‌تواند اصلاً سوزشی نداشته اما رفلاکس داشته باشد.

سوزش سردل یا ترش کردن علامت اصلی رفلکس  فاخره بهبهانی
معده به مری است.

البته گاهی این بیماری، خاموش و بدون علامت یادداشت

تظاهر تعدادی از نشانه های غیر از سوزش سردل بروز می کند و فرد با یک سری علائم مواجه می شود که علت آن نمی داند.

توجه به این که در طبع رایج، درمان این بیماری با داروهای شیمیایی مختلف جام می شود، اهمیت موضوع موجب شدت ارخصوص اقدامات و درمان های در طبع سنتی برای مداوای این بیماری در نظر گرفته شده و همچنین ارتباط شایه بیانی سری علائم رفلکس با بیماری کووید-۱۹ نظیر سرفهای مکرو و مبتلا لات گوارشی، اطلاعاتی کسب کنیم.

این رو با دکتر الهام پارسا، پژشك متخصص طب سنتی گفت و گو کرده ایم که سخایشان به پیشش ها و ابهامات مطروده را در ادامه می خوانید.

۳- فلاکس با سوزش یا بدون سوزش

بیماری فلاکس معده، ناشی از بارگذشت غیرطبیعی محتویات معده به مری است. این بیماری که علامت اصلی آن سوزش سر دل است، به واسطه عوامل آناتومیک و عملکردی نارسایی دریچه تحتانی مری رخ می‌دهد. سوزش سر دل که بیشتر در بالای شکم وزیر سینه حس می‌شود، گهگاه سبب تیرکشیدن پشت جناغ هم می‌شود. سوزش سر دل، اعلانه رفلاکس است اما فرد می‌تواند اصلاً سوزشی نداشته اما رفلاکس داشته باشد.

٩	٤	٥	٣	٧	٦	٨	٢	١
٣	٢	٨	٩	٤	١	٥	٦	٧
٧	١	٦	٨	٢	٥	٩	٣	٤
٨	٥	٢	٧	٣	٤	٦	١	٩
٦	٣	٤	٢	١	٩	٧	٥	٨
١	٧	٩	٦	٥	٨	٢	٤	٣
٢	٩	٧	١	٦	٣	٤	٨	٥
٤	٦	١	٥	٨	٧	٣	٩	٢
٥	٨	٣	٢	٩	٤	١	٧	٦
٨	٣	٧	٥	٢	١	٤	٩	٦
٥	٢	١	٩	٤	٦	٣	٧	٨
٦	٤	٩	٨	٧	٣	٢	١	٥
٣	٦	٧	٥	٢	١	٤	٩	٦
٥	٢	١	٩	٤	٦	٣	٧	٨
٦	٣	٧	٤	٨	٩	٥	٢	١
٢	٨	٥	٦	٣	٧	٥	٤	٩
٤	٦	٩	٢	٨	١	٣	٧	٥
٣	١	٧	٩	٥	٤	٨	٢	٦
٥	٧	٢	٣	٤	٦	١	٨	٩
٨	٩	٤	٧	١	٥	٦	٣	٢
١	٣	٦	٨	٩	٢	٥	٤	٧

سودوکو ۳۶۱۵

نیازمندی های نیازمندی های

[۱] از زمان شیوع ویروس کرونا محلول‌ها و ژلهای ضد عفونی کننده دست به یک جزء ضروری زندگی ما تبدیل شده‌اند. با توجه به نقش این محصولات در حفظ سلامت ما، شناخت علمائی که نشان می‌دهد محلول ضد عفونی کننده شما کارایی لازم را ندارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. موارد زیر این زمینه در نظر داشته باشید:

دریوش محصول برای مدت زیادی بازیوده است

اگر در پوشه محصول ضد عفونی کننده دست شماربای مدتی بیش از یک روز باز بوده است، لازم است محلول را جایگزین کنید. دلیلش این است که الکل به عنوان ماده اصلی ضد عفونی کننده در محلول، به سرعت تبخیر می‌شود و کاهش یا تمام الکل محلول، قدرت ضد عفونی کننگی آن را به شدت تضعیف می‌کند.

[۲] محلول در معرض گرمایارگرفته است: عامل دیگر تبخیر الکل، قرار گرفتن محلول ضد عفونی کننده در معرض نور مستقیم خوشبید یا رهایشدن آن در داخل خودرو است. طبق اعلام مرکز مبارزه با بیماری‌های آمریکا (CDC)، اتیل الکل که عموماً در محلول ضد عفونی کننده دست کاربرد دارد، در دمای اتاق شروع به تبخیر می‌کند. حتیاً بطری ضد عفونی کننده خود را در محیط خنک و حشک نگهداری کنید.

[۳] کل محلول کمتر از ۶ درصد است: بهتر است میزان الکل محصول بین ۶۰ تا ۷۵ درصد باشد. زیرا مقداری از الکل ناگزیر بر استفاده زمرة تبخیر می‌شود. اگر میزان الکل ضد عفونی کننده، از ابتداء ۶ درصد یا کمتر باشد، محلول به سرعت تاثیر خود را از دست خواهد داد.

[۴] تاریخ انقضای محصول گذشته است: به گفته کارشناسان، اگر سه سال از زمان خرید محلول ضد عفونی کننده گذشته باشد احتمال آن که محلول، تاثیر خود را زد دست داده باشد زیاد است. با این حال بهتر است به تاریخ انقضای درج شده روی محصول هم توجه داشته باشید، زیرا ممکن است محلول ضد عفونی کننده زودتر از سه سال تاثیرگذاری خود را از دست بدهد.

[۵] محلول، بوی غیرطبیعی دارد: اگر نمی‌توانید تاریخ انقضای محصول را روی بطری پیدا کنید و مطمئن نیستید قدر از عمر ضد عفونی کننده دست شما گذشته است، سعی کنید آن را به دقت بوکنید. برخی از مواد تشکیل دهنده ضد عفونی کننده ممکن است پس از گذشت تاریخ انقضای شروع به تولید بوهای غیرطبیعی کنند. افزون بر این، اگر بوی اتانولی که استشمام می‌کنید ضعیف باشد، علامت مطمئنی است که نشان می‌دهد مقدار زیادی از الکل تبخیر شده است.

[ba-bamail.com: منبع]

۳	۸	۲				۶	
			۲	۱		۹	
				۵		۷	
۳	۶	۷			۱		
۴		۲			۳		
۵	۳	۱	۹				
۸		۱					۱
۵		۷	۸				۵
۱				۸	۹	۵	۳
						۸	۴
					۲	۳	
					۷	۴	
۵	۶	۴			۳		۵
			۶	۲		۴	
				۴		۶	
۳	۵	۱			۲		
۵		۶			۱		
۱	۲	۹		۳			
۹		۱					۸
۳		۷	۸				۵
۱				۶	۹	۷	۶

۶ علت اصلی ریزش مو

وقتی شانه سرمان پرمو می‌شود، به هول و هراس می‌افتیم که چرا؟ ریزش مو از جمله مشکلاتی است که می‌تواند اعلیٰ سطح بسیار مختلف، ناشی شود؛ بدین خصوصیت، از شایع‌ترین علل مترجم: صدف دژگوود سلامت

ریزن مو عبارتنداز: **تغییرات هورمونی**: خانمها ممکن است پس از زایمان یا طی دوران یائسگی دچار ریزن مو شوند؛ به هم خودن تعادل هورمونی یکی از عوامل ریزن مو در خانم هاست.

آقایان هم، علاوه بر علل ژنتیکی، گاهی براثر تغییرات هورمونی ناشی از افزایش سن ریزن مو می گیرند.

اختلالات تیروئید: اختلالات تیروئید رامی توان از شایع ترین علل هورمونی ریزن مو دانست. کم کاری و پرکاری تیروئید می تواند ریزن مو ایجاد کند. اما بار دارمان مشکل تیروئید معمولاً قصیه قابل حل است.

استرس: استرس، هم از نوع فیزیکی و هم روانی، می تواند ریزن مو بیاورد. از جمله استرس های فیزیکی می توان به جراحی، تپ شدید، از دست دادن خون و همچنین زایمان اشاره کرد؛ علل استرس فیزیکی معمولاً موقتی است و ریزن مو پس از بهبود بدن کاهش پیدا می کند.

اما استرس روانی هم مساله مهمی است؛ بسیاری ادعامی کنند که در

داروهای اغلب داروهای با فهرستی بلندبالا از عوارض رنگارنگ عرضه می‌شوند. از جمله داروهایی که می‌توانند ریزیش مو ایجاد کنند، عبارتند

از داروهای شیمی درمانی، داروهای تیروئید، برخی داروهای ضدبارداری خواهک دارم اما نهادنی نداشته باشم. با این حال ممکن است بگذرانم.

دروزی، دارویی پذیرش، داروهای ضدسیستمی، داروهای ضد حسنه‌گردی و داروهای ضدانعقادی. البته، داروها می‌توانند روی هر فردی تأثیر متفاوتی داشته باشند و داروهای با عارضه جانبی ریزش مو نزوماً در همه

کمبودهای تغذیه‌ای: کمبود روی و آهن رامی‌توان شایع‌ترین کمبود تغذیه‌ای مرتبه با ریزش مو دانست. کمبود ویتامین C، A و B12 همچنین کمبود مس، سلیویوم و بیوتین هم بی‌تأثیر نیست.

لوبوس: لوبوس نوعی بیماری خودایمنی است که می‌تواند سبب ریزش مو شود. متخصصانه برخی داروهایی هم که برای درمان لوبوس تجویز می‌شوند، ممکن است ریزش مو ایجاد کنند.