

معجزه لیزر

آسم ریوی از

A close-up photograph of a person's mouth showing upper dental braces. The person is smiling, and their fingers are visible near their chin.

مردم به دلیل استرس کرونا بیشتر دندان قروچه می‌کنند

تماس‌های تلفنی افرادی رو به رو شده‌اند که از درد فک، حساسیت دندان، بی‌حس لب و سردرد شکایت دارند. مواردی که تمامی شان علائم دندان قروچه است. دندانپزشکان برای جلوگیری از آسیب بیشتر دندان‌ها از مان بطرف شدن مشکل استرس، گداشتن محافظت دهان در شب را برای بیماران تعویز می‌کنند. / اینستا

گردد مدارس از ضد عفونی کننده های خاص استفاده شد...

آیا مدارس براساس استانداردهای بهداشتی ملزم به استفاده از ضد عفونی کننده های خاصی هستند؟ در این صورت باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ احمدی بازی، کارشناس حوزه سلامت و ایمنی در پاسخ می گوید: فقط در صورت استفاده از ضد عفونی کننده های برپایه کلریاید حواس مان به رنگ ببری و آسیب های این مواد به ریه، پوست و چشم ها باشد و در صورت برنامه ریزی برای ورود گروه بعدی دانش آموزان به کلاس باید فاصله زمانی و تهويه مناسب برای آن اختصاص داده شود. همچنین در صورت استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح برپایه الكل در مقادیر زیاد علاوه بر تحریکات پوستی باید مراقب اشتعال و انفجار به واسطه تشکیل بخارات قابل اشتعال بود. گرچه ضد عفونی سطوح بالا در دستورالعمل مراقبت و کنترل کووید-۱۹ به میزان حداقل دوبار در روز عنوان شده، ولی کفايت دور مرتبه ضد عفونی وزمان های اب، کار و صحیح احاشد، آن واقع جایز است.



یک کارشناس ارشد حوزه سلامت و ایمنی معتقد است تامین ایمنی و بهداشت مدارس و الزام دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی اگر در عمل غیرممکن نباشد، پیچیدگی های فراوانی دارد

مشکلات زندگی ئ ساعته زیر يك سقف

داشته باشیم با ورود دانشآموزان
جدیدبهکلاس،ضدغفونی قبلي ازاعتبار
ساقط خواهد شد. حتی یکی ازمواردی
که در محافل معتبرینالملى برآن
تاكیدیم شود بهاشتران نگذاشتند و
قرض ندادن وامانت نگرفتن تجهیزات
ونوشت افزار اسوي دانشآموزان و
اولیای مدرسه است.

هزارای های مدارس در اوضاع فعلی
شرابط بهداشتی دستشویی ها و
آبخوری های مدارس در اوضاع فعلی
چگونه باید باشد؟

طبق دستورالعمل مراقبت و کنترل
کرونوا و پیروس (کووید-۱۹) در مدارس،
ضدغفونی دستشویی ها و آبخوری ها،
حداقل دومرتبه روز عنوان شده
است که به نظر باید بیشتر باشد. ولی
با زهم اجرایی شدن آن از حیث عملی به
نظر ساده نیست. همچنین نصب مایع
دستشویی و مواد ضدغفونی کننده
دستشویی و مواد ضدغفونی کننده
خط بزرگ داشتند. همان‌جا

حظر یزیر مدرسه است. نهاده این
نهاده این دستشویی های مدارس
که شاید کمتر به آن توجه می شود،
نهاده مناسب آن است که در صورت
عطفه یک فرد مبتلا یا ناقل، خطر ابتلا
بدون تهییه هوا ممکن است تا دقیقی
بعد از عطفه و حضوری در محل باقی
باشد. توصیه دستورالعمل یادداشته
بر استفاده از آب های بسته بندی
شده است که بیرون ظرف محتوی
هم شسته و تمیز باشد. به نظم اجرای
کاملاً آن اعقاب عجید به نظر می رسد.
همچنین این دستورالعمل به استفاده
مراقب بهداشت خود باشند.
پایش سلامت هر دانش آموز را

دیدن چه نشانه هایی از حیث خطر

۱۸۰ سانتی‌متری برای هر دانش‌آموز مطرح شده که این خود چالش بزرگی برای مدارسی است که با تعداد ۴۰ تا ۳۰ دانش‌آموز در هر کلاس روبرو هستند. البته مدیران بحث گروه بندی دانش‌آموزان به مثلاً گروه‌های ده یا ۱۵ نفره یا بیشتر را مطرح می‌کنند که در این صورت باید حواسمنان به ضعیفونی سطوح بعد از هر بار اتمام کلاس داشت آموزان و همچنین شرایط اینمی مرتبط با استفاده از مواد ضعیفونی کننده سطوح باشد. به این روش کرونا واقعاً هنوز اطلاعات بادی در دسترس نیست و اطلاعاتی به به عنوان شرایط و دستورالعمل با صیه عنوان می‌شود، عمدتاً براساس ووهش‌های گذشته است. نکته حائز اهمیت، نگرش مبتنی بر پریسک در این شرکت برای حضور دانش‌آموزان در شرکت شود است. به عنوان مثال شنیده شد که در این شرکت دانش‌آموزان در لاس بهتر است ده بار در ساعت (یا روش دقيقه) هواس کلاس تعویض شود. تاکیدیم کنم تعویض هوای هوای از از و نه چرخش و جابه‌جایی هوای

۱	۵	۶	۷	۱	۲	۸	۳	۹
۸	۳	۹	۵	۴	۶	۷	۲	۱
۷	۲	۱	۹	۸	۳	۵	۶	۴
۲	۸	۳	۴	۵	۱	۶	۹	۷
۱	۷	۴	۲	۶	۹	۳	۵	۸
۹	۶	۵	۸	۳	۷	۱	۴	۲
۶	۴	۲	۱	۷	۵	۹	۸	۳
۵	۹	۷	۳	۲	۸	۴	۱	۶
۳	۱	۸	۶	۹	۴	۲	۷	۵

یاری:
گننه مهمن در مورد
دستشتبه‌های
مدارس که شاید
کمتر به آن توجه
می‌شود، تهویه
ناسب آن است که
صورت عطسه یک
فرد مبتلا یا ناقل
خطر ابتلابدون
تهویه هوا ممکن
ست تا دقایقی بعد
از عطسه و حضور
وی در محل
باقی باشد

۹	۵		۱	۷	۶
۷	۴		۹	۲	۵
۶	۲		۳	۴	۸
۲	۱		۷	۸	۹
۵	۸		۶	۳	۶
۳	۷		۵	۱	۲
۸	۳		۴	۹	۷
۴	۹		۸	۶	۱
۱	۶		۲	۵	۳

بدهسته و خیریه های جسمی و از سطح پوست
ناخیه ریه ها خواهد بود. ناگفته نماند
لیزترابی کم توان در بیماری آسم جزو
روش های درمانی نوین، مؤثر، بدون عارضه
و مقرون به صرفه است.

برای حل جدول اعداد باید در هر مریع کوچکتر ۳ در ۳ هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد.
همچنین هیچ عددی در یک سطر باستون مریع بزرگ ۹ تکرار نشده باشد.

مسائله تغذیه زنگ تفریح دانش آموزان



بی شک دانش آموزان در فاصله هر کلاس درسی، گرسنه یا تشنگ می شوند. خیلی از اولیا و معلمان می پرسند در شرایط کنونی آیا بچه ها مجازند ماسک ها را در فواصل هر زنگ درسی بردازند و تغذیه بخورند؟ این کارشناس حوزه سلامت و ایمنی معتقد است شرایط تنفسی و این که واقع ادر عمل چه شرایطی پیش خواهد آمد باهم متفاوت است. در صورتی که دانش آموزان در فضای آزاد و با فاصله حداقل دو متري از هم باشند و دست ها و صورت و ماده غذایی (پوشش بیرونی بسته بندی) تمیز باشد، شاید بتوان عنوان کرد ریسک ابتلا کاهش می یابد. ولی به یادداشت هه باشیم این فاصله ممکن است در فعالیت های ثابت قابل کنترل باشد. ولی برای دانش آموزان پر جنب و جوش بعید به نظر می رسد که مقدور باشد. البته به گفته برخی متخصصان قرار است مدت کلاس هادر صورت برگزاری، کمتر از ۳۵ دقیقه باشد که در این صورت عدم تداخل و همزمانی حضور بچه هادر حیاط مدرسه همی تواند بسیار تعیین کننده باشد.

هر پنج دقیقه را مطربه می‌کنند.
البته تعداد بسیار محدودی از مدارس
کشور که غالباً مدارس غیردولتی هم
هستند ممکن است به لحاظ استفاده
از سیستم‌های تهویه مشکل کمتری
داشته باشند و شرایط استفاده نکردن
مجدداً از هوای داخل مدرسه خود را
فراموش کنند. به این صورت که سیستم
تهویه را در ساعت قبل از ورود و دو
ساعت بعد از خروج دانش‌آموزان فعال
و روشن نگه می‌دارند. این تازه شروع
ماجراست و نگرانی ویژه ازمنی است
که با سرعت ترشدن هوادر آبان یا اوایل
مهر پنجه‌ها باید بسته شود و بعید
می‌دانم امکان برقراری شرایط ذکر شده
مهیا باشد.

[۴] فاصله‌گذاری اجتماعی بر رعایت
فاصله‌های اتاومترافرال از یکدیگر تاکید
دارد. رعایت این فاصله به ویژه در
دانش‌آموزان دبستانی که تقریباً
ساکن ماندن آنها در یک جا و در زمان
بالای یک ساعت غیرممکن است،
چگونه قابل اجراست؟

در توصیه‌های مرکز پیشگیری و
کنترل بیماری‌های ایالات متحده برای
ما گذشتند که از این مراحل ابتدا

WGBH

افشانه‌های حشیش، ماری‌جین، بیماری، آسم