


درد پاشنه پا را نادیده نگیرید



پرهام پارسانپور

فیزیوتراپیست

عضلات پشت ساق پا که عضلات کاف نام دارند، نقش بسیار مهمی در ایستادن و راه رفتن ما دارند. در واقع اگر آنها دراز و بی‌انرژی باشند، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند. امکان حفظ تعادل هنگام ایستادن وجود ندارد. این عضلات از پشت زانو شروع می‌شوند و با تاندون آشیل به پشت پاشنه می‌رسند. غشای کف پایي که در ناحیه کف پا از پاشنه به پنجه اتصال دارد هم در راستای این عضلات و تاندون آشیل قرار دارد و هر کششی از سوی عضلات کاف به غشای کف پایي منتقل می‌شود. ذکر این مطلب از این جهت است که بدانیم برای سلامت استخوان‌ها و مفاصل مچ و کف پا باید عضلات کاف سالم باشند و به‌صورت طبیعی کار کنند. وقتی وزن‌مان بالا می‌رود، وقتی بیش از معمول سرپا می‌ایستیم، وقتی بعد از مدت‌ها از یک کفش خاص استفاده کرده‌ایم و پاهایمان باکفی، پاشنه و شکل رویه آن عادت کرده، کفش یا صندل جدیدی را یک‌باره به مدت طولانی استفاده می‌کنیم، وقتی برخلاف همیشه که از کفش و دمپایی پاشنه‌دار استفاده می‌کنیم، زمان زیادی را برهنه بایستیم یا راه برویم، عضلات کاف برای حفظ تعادل ما هنگام ایستادن و جلوگیری از هنگام راه رفتن خسته و آزرده می‌شوند. این خستگی باعث بیشت‌شدن انقباض در آنها شده و کشش بیشتری به ناحیه پاشنه اعمال می‌شود. این اعمال کشش بیشتر به ناحیه پاشنه هم در محل اتصال تاندون آشیل و هم در محل اتصال غشای کف پایي به آن اتفاق می‌افتد و به‌مرور زمان باعث ایجاد التهاب و تورم در یکی از این نواحی یا هر دو می‌شود. به دنبال التهاب طولانی‌مدت و ادامه فشار بیش از حد بر آنها امکان رسوب کلسیم در این قسمت‌ها وجود دارد که در زیر پاشنه، زانده استخوانی به نام خار پاشنه ایجاد می‌کند.



استرس سلامت دهان و دندان را تهدید می‌کند

کارشناسان دریافته‌اند وجود مشکل و نقص در سیستم ایمنی بدن می‌تواند شرایط را برای رشد آفت دهان فراهم کند و استرس می‌تواند احتمال بروز آفت دهان را افزایش دهد.

این افراد همچنین به منظور برطرف‌کردن آفت دهان از مصرف غذاهای تند، داغ



نمایی از فرآیند لقاح مصنوعی و باروری تخمک زیرمیکروسکوپ




دکتر انصاری پور: خیلی از زوج‌ها فکر می‌کنند حاملگی از طریق آی‌وی‌اف سقط نمی‌شود در صورتی که سرنوشت از دست رفتن جنین به‌طور نامحسوس و محسوس در آی‌وی‌اف هم وجود دارد



پونه شیرازی سلامت

مدت زمان زیادی از تحولی بزرگ در حوزه درمان ناباروری تحت‌عنوان پزشکی شخصی یا ژنومی نمی‌گذرد؛ تحولی که حاصل آن بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین ژنتیک برای درمان آن دسته از زوجین ناباروری است که تلاش‌شان برای آی‌وی‌اف، چند بار با شکست مواجه شده است و با بهره‌گیری از روش پزشکی شخصی و غربالگری ژنتیک جنین‌شان می‌توانند بر عوامل شکست مکرر آی‌وی‌اف یا



یک متخصص زنان، زایمان و ناباروری می‌گوید شایع‌ترین دلیل شکست آی‌وی‌اف، وجود جنین غیرطبیعی از نظر کروموزومی است

«سقط مکرر»؛ سرنوشت جنین‌هایی با ژن معیوب

سقط مکررغلبه‌کنند و صاحب فرزند شوند.

به بیان دیگر در این تکنیک با انتخاب جنین سالم از لحاظ تعداد کروموزوم‌ها، احتمال بارداری موفق افزایش می‌یابد. گرچه پرهزینه‌بودن مراحل بهره‌گیری از این تکنیک از نقاط ضعف آن برای استفاده تعداد زیادی از زوجین نابارور محسوب می‌شود. اما ارزشمندی آن در پایان دادن به ناگامی ناشی از سقط‌های مکرر سبب شد با دکتر سهیلا انصاری پور، جراح و فلوشیپ زنان، زایمان و ناباروری و عضو هیات علمی پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر این سینا گفت‌وگو کنیم.

چرا در برخی زوجین نابارور، آی‌وی‌اف با شکست مکرر مواجه می‌شود؟

باروری حاصل لقاح یک اسپرم و تخمک و جایگزینی آن در رحم است. به بیان دیگر در یک حاملگی طبیعی، اسپرم و تخمک سالم لقاح می‌کنند، در رحم جایگزین می‌شوند، حاملگی اتفاق می‌افتد و به زایمان نوزاد منتهی می‌شود. معمولاً لقاح در یک چرخه ماهیانه در ۲۵ درصد موارد و در سنین بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی اتفاق می‌افتد و هرچه سن از این دوره بالاتر برود میزان لقاح پذیری هم کاهش می‌یابد.

پس ما به‌طور طبیعی دوره لقاح‌پذیری کوتاهی داریم. یعنی از هر ۱۰۰ زوجی که ازدواج می‌کنند در صورتی که سالم باشند، در ماه اول ازدواج فقط ۲۵ نفرشان باردار می‌شوند و ۷۵ نفرشان باید تا یک سال منتظر باشند. به‌همین دلیل هم تعریف

نازایی را اتفاق نیفتادن بارداری پس از گذشت یک سال در نظر می‌گیرند. با این حال بعد از این‌که لانه‌گزینی جنین اتفاق افتاد، حتی جنینی‌که لقاح پیدا کرده ممکن است سقط شود. یعنی در ۱۵ درصد زوج‌های طبیعی نیز یک‌بار سقط ممکن است در ۱۲ تا ۱۵ درصد مواقع اتفاق بیفتد. این در واقع سقط بالینی است. اما سقطی که به‌طور نامحسوس است حتی در ۵۰ درصد موارد هم ممکن است اتفاق بیفتد.

آیا علت موفق نبودن ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد آی‌وی‌اف وجود مشکلات ژنتیک در جنین است؟ این طور تصور می‌شود که یکی از شایع‌ترین دلایل شکست آی‌وی‌اف وجود جنین غیرطبیعی از نظر کروموزومی است. معمولاً لقاح در آی‌وی‌اف صورت می‌گیرد، اما به‌دلیل نقص کروموزومی جنین، رشد طبیعی در داخل رحم اتفاق نمی‌افتد و سقط

باعل و راه‌های درمان این مشکل بیشتر آشنا شوید.

چه عواملی می‌تواند باعث خشکی دهان شود؟

داروها

خشکی دهان از عوارض جانبی مصرف بسیاری از انواع داروها از جمله

داروهای افسردگی، آگزری و سرماخوردگی و فشار خون بالاست.

کم‌آبی بدن

کمبود آب بدن زمانی اتفاق می‌افتد که بیشتر از میزان مصرف خود، مایعات از دست بدهید. افراد در هر سنی ممکن است دچار کمبود آب شوند، اما افراد سالمند به‌طور ویژه مستعد ابتلا به آن هستند.

پرئودرماتی

غدد بزاقی در صورت قرارگرفتن در معرض اشعه‌طی درمان سرطان، ممکن است آسیب ببینند.

شیمی‌درمانی

داروهایی که برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند غلظت بزاق را افزایش می‌دهند و خشکی دهان را ایجاد می‌کنند.

آسیب به سر یا گردن

آسیب به سر یا گردن می‌تواند به اعصابی که به غدد بزاقی، فرمان تولید بزاق می‌دهند، آسیب برساند.

بروز تبخال فراهم می‌شود.

از سوی دیگر، استرس ممکن است باعث شود فرد دندان‌های خود را به یکدیگر فشرده و روی هم بساید. توصیه می‌شود این افراد هنگام خواب از محافظ دهان یا وسیله دیگری که مانع از دندان قروچه می‌شود، استفاده کنند./ايسنا

احتمال بالای بروز نقایص ژنتیک در لقاح با آی‌وی‌اف

از دکتر انصاری پرسیدم: آیا پس از دو مرتبه شکست درمان ناباروری (آی‌وی‌اف) باید به وجود مشکلات ژنتیک در جنین شک کرد؟

این متخصص زنان و زایمان و ناباروری در پاسخ گفت: وقتی نازایی پیش می‌آید یعنی به‌دلایلی در لقاح تخمک و اسپرم یا در لانه‌گزینی مشکلی وجود دارد. یعنی با اسپرم نمی‌تواند حرکات طبیعی را طی کند یا کیفیت تخمک نامناسب است. با روش‌های کمک باروری این اختلالات به‌نوعی برطرف می‌شود، میکرواینجکشن صورت می‌گیرد، اسپرم طبیعی‌تر انتخاب می‌شود و در آزمایشگاه لقاح یافته و جنین در رحم گذاشته می‌شود. اما ممکن است همچنان اسپرم و تخمکی که لقاح پیدا کرده از نظر ژنتیک ناسالم باشد. یعنی تخمک و اسپرم از نظر ظاهری سالم باشند ولی در لقاح حاصل از آی‌وی‌اف، احتمال بروز نقایص ژنتیک جنین بالاست.

سالم هستند، فقط جنین‌های سالم انتخاب شوند و تئک‌تک به رحم انتقال پیداکنند تا به این ترتیب احتمال حاملگی موفق افزایش و احتمال دوقلویی و چندقلویی طی فرآیند آی‌وی‌اف کاهش یابد.

این روش، انتقالی در آی‌وی‌اف به‌پا کرده و از نظر تئوری روشی ایده‌آل محسوب می‌شود. ولی به‌نظر می‌رسد هنوز مشکلاتی وجود دارد. نخست این‌که سلولی که برای بررسی ژنتیک از جنین گرفته می‌شود، مؤید سالم بودن کامل جنین نیست. دوم این‌که در برخی موارد، جنین‌های سالم به‌صورت کاذب نا سالم تشخیص داده می‌شوند.

با این حال سه گروهی که گفته شد به‌عنوان نامزدهای این روش از سوی متخصصان انتخاب شدند. اما گروه

دیگری از متخصصان نیز معتقد بودند خانم‌ها در سنین طبیعی باروری از این روش بیشتر سود می‌برند و این چالش‌ها در به‌کارگیری تکنیک بررسی ژنتیک جنین پیش از لانه‌گزینی همچنان مطرح است.

در صورت بهره‌گیری از این تکنیک ژنتیک، موفقیت آی‌وی‌اف چقدر افزایش می‌یابد؟

اوایل که این روش معرفی شد، موفقیت ۸۰ درصدی آی‌وی‌اف را گزارش داد، اما در ادامه مشخص شد از نظر آماری این نتایج دقیق نیست، اما بدون شک این روش تا ۱۵ درصد موفقیت ۳۵ درصدی آی‌وی‌اف را افزایش می‌دهد. به این ترتیب آی‌وی‌اف به موفقیت ۵۰ درصدی دست می‌یابد.

این روش در پژوهشگاه ابن سینا هم در چند سال اخیر ارائه می‌شود؛ به‌ویژه برای زوج‌هایی که مشکل ژنتیک دارند.]

بیشتر بدانیم

آنچه از خشکی دهان باید بدانید

خشکی دهان چه علائمی دارد؟

از آنجا که بسیاری از علائم خشکی دهان با سایر مشکلات دهان و دندان نیز مرتبط است باید به محض مشکوک‌شدن به خشکی دهان مزمن، دندانپزشک خود را در جریان قرار دهید.

همواره متوجه این علائم خشکی دهان باشید؛ بوی بد دهان، ترک خوردگی لب‌ها و داخل گونه‌ها، مشکل در درک طعم غذا، درد و التهاب زبان، پوسیدگی مکرر دندان‌ها، مشکل در صحبت‌کردن و بلعیدن و جویدن، احساس براق سفت و چسبنده، پیدارشدن از خواب در اثر تشنگی، التهاب لثه و خشکی

گلو.

راهکارهای خانگی برای رفع خشکی دهان

در بسیاری از موارد ایجاد تغییرات ساده در برنامه روزانه می‌تواند خشکی دهان را برطرف کند. برای افزایش تولید بزاق این موارد را امتحان کنید؛ به جای نوشیدنی‌های گازدار یا شیرین، آب بیشتری بنوشید. آدامس حاوی زایلیتول بجوید. از دهان‌شویه حاوی الکل استفاده نکنید، غذاهای ترد مانند هویج، کرفس، سیب یا بادام بجوید. یک رطوبت‌ساز در اتاق خواب خود قرار دهید، از مصرف غذاهای خشک و پرادویه پرهیزید و مصرف کافئین را محدود کنید.

درمان‌های احتمالی که ممکن است دندانپزشک توصیه کند عبارتند از:

• مصرف داروهای جایگزینی که عارضه جانبی خشکی دهان را ایجاد نکنند.

• تجویز دهان‌شویه، بزاق مصنوعی یا سایر مرطوب‌کننده‌های دهان.

• تجویز داروهای تحریک‌کننده تولید بزاق.

• توصیه به استفاده از محصولات حاوی فلوراید برای جلوگیری از پوسیدگی دندان.]