


مرگ براثر مصرف جگر خام آلووده

شایرین گوارashi بکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که توسط پاکتری باسیلوس آکتساسیس ایجاد می‌شود. اگرچه فرم بوستی بیماری شایرین پهادشت و امنی بسیار شایع‌تر از فرم گوارشی است، اما کاهه مصرف گوشت و اندام‌های گوشتش آلووده نیز ممکن است سبب ابتلای انسان شود. عالم فرد مبتلاً عدتاً شامل اسهال، استفراغ و دل درد است که امکان دارد با گلودره باختال در باب غذا همراه شود. در صورت عدم درمان در موقع مرگ بیمار محتمل است.



اوایل مرداد ۹۶ گزارش تاسف باری مبنی بر فوت یک پسر نوجوان ۱۶ ساله در شهرستان بدسنکن واقع در استان خراسان رضوی به دلیل ابتلا به شایرین گوارشی براثر مصرف جگر خطری جدی به وجوده در استان‌های سیل زده کشته محسوب شود. زیرا هاگه‌های با تکری پاسیلوس آکتساسیس معمولاً در اعمال خاک و جسد از دارند و سیلان موجب انتقال و چاهه‌جای اعمال با تکری این بیماری به سطح خاک شده که گسترش آلوودگی را در بی دارد. از سوی دیگر در فروردین امسال شاهد وقوع سیل ضرورت رعایت اقدامات بهداشتی پیشگیرانه احساس می‌شود.

نکته بسیار مهم آن است که باید از کشثار خانی حیوانات پربریز شود و دامداران نیز شخصاً اقدام به ذبح دام‌های خود نکنند. برای این کار بهتر است دام خود را به نزدیک ترین کشتارگاه منطقه منتقل کنند یا ذبح حیوانات در محل و تحت نظر دامپزشکان انجام شود. گفتنی است پرهیز از مصرف گوشت و جگر نیم پخته یا اصطلاح آبدار بسیار مهم است. همچنین دامداران باید در صورت مشاهده مرگ ناگهانی دام یا خروج خون از منافذ طبیعی لاهه دام تلف شد، حتماً با دستکش و روپوش نسبت به دفن لاشه در پل گودال عبیق اقدام و روی آن را آهک ضدغذوی کنند تا از گسترش آلوودگی جلوگیری شود.

کودکان دارای بستگان مبتلا به افسردگی، ۳ برابر بیشتر افسرده می‌شوند



یک روانپژوه که یک از بستگان درجه یک آنها مبتلا به افسردگی باشد، سه برابر بیشتر از سایر کودکان مبتلا به این اختلال می‌شوند. دکتر مهدی اجتی افزود: اختلال افسردگی در کودکان به عوامل زنیکی- زیستی و روانی- اجتماعی بستگی دارد و ۴۰ تا ۵۰ درصد این اختلال زمینه‌های خانوادگی دارد.

آنچه خانم‌ها از زمان مراجعه به پزشک و معاینات دوره‌ای باید بدانند

بررسی‌های پزشکی زنانه چرا و چه وقت؟

همه افراد از بدو تولد تحت معاینه یک متخصص کودکان گیرند و در سال‌های اولیه زندگی تا سن بلوغ معمولاً توسيط متخصص اطفال یا پزشکان عمومی معاینه و درمان می‌شوند.

اما اوضاع بعد از سن بلوغ به ویژه برای دخترها کمی فرق می‌کند؛ به عبارتی مساله سلامت آئین حساس‌تر و مهمن‌تر شود؛ چراکه دختران نوجوان امروز مادران نسل بعد خواهند بود و به همین لبل سلامت جسمی و روانی آنها برای تأمین سلامت نسل بعد و جامعه‌هایمیت دارد. این مقادمه را گرفتگی تا بهمیت و ضرورت برسی‌های دوره‌ای زنانه دروان بلوغ تاسیلهای پس از زایشگی پی‌برید. این که انجام معاینات و برسی‌های دوره‌ای زنانه دارد چه مواردی و یا مشاهده‌های نشانه‌هایی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود را در

گفت و گو با تکرآمدۀ لاهوتی، متخصص زنان و نوزایی برسی خواهیم کرد.

پونه شیرازی سلامت

بازار (به صورت ماهانه) و نیز تا چند هفته

باشد. این برسی‌ها پس از زایمان باید تحت نظر پزشک متخصص

زناید. باشند.

تداوم برسی‌های پزشکی‌های پس از یائسگی

بررسی‌های پس از یائسگی و قطع قاعدگی هم

احتمال بیماری‌های رحم و تخمدان‌ها متفاوت

نمی‌شود و یک سری بیماری‌های بد خدم در

این زمان شیوع بیشتری می‌یابد.

آزمون‌های غربالگری مثل پا اسپیر و

اسپیر برسی کرد. در این صورت اگر پا اسپیر

و تست و برسی پایی‌لوما منفی باشد، زمان تکرار

می‌باشد. هرگونه علامتی مثل خونریزی یا

لکه‌بینی حتی برای فقط یک دلار، ترشی از ازان

و درد و بزرگ شکم در این افراد غیرطبیعی

است و هتماً باید با مراعته به مخصوص زنان

بررسی شود؛ زیرا ممکن است علامت بیماری

مهمی مثل سرطان رحم و تخمدان باشد که

می‌تواند در صورت تشخصیز زودرس، قابل

دریابشان آنچه شود. در این دوره باید مصرف

اسیدوفولیک را شروع کنند و هم در تمام دوران

باشند.

مراجعات ماهانه دربارداری

خانه‌دار و باران دارای هم باید به متخصص

زناید. زمانی که تصمیم به بارداری

می‌شود، یعنی حداقل از سه ماه پاید تخت

نظر مخصوص زنان بود و یک سایه سرطان

در این دوره باید خود را باشد توسعه خانم

در عایشه توده‌ای مشخص شود یا هر علامت

بیشتر پارسی پزشکی دخترانه معمولاً پیش

لگنی شود

بعضی از عفونت‌های زنان

هستند که بدون آن که علامتی داشته باشند

چند بار نیاز به مراجعت پزشک داشته باشد

این مراجعات زمانی صورت می‌گیرد که فرد در حالی که همه

مشکل با بیماری شده است، اما بهترین حالت

وقتی است که فرد در شرایط که هنوز بیماری

پامشکل ندارد تحت نظر پزشک باشد که

شناخت کلی ازوی و بدنی داشته باشد هم

بررسی‌های پزشکی دوره‌ای را برای این اجرام دهد

دستگاه تناسی (مثل رحم و تخمدان) را

در لایحه می‌گیرد که این موضع می‌تواند زنگ

خرابی جدی به وجوده در استان‌های سیل زده

کشته محسوب شود. زیرا هاگه‌های با تکری

پاسیلوس آکتساسیس معمولاً در اعمال

خاک و جسد از دارند و سیلان موجب انتقال

و چاهه‌جای اعمال با تکری این بیماری به

سطح خاک شده که گسترش آلوودگی را در بی

دارد. از سوی دیگر در فروردین امسال شاهد

وقوع سیل ضرورت رعایت اقدامات بهداشتی

بنابراین احساس می‌شود.

نکته بسیار مهم آن است که باید از کشثار

خانی حیوانات پربریز شود و دامداران نیز

شخصاً اقدام به ذبح دام‌های خود نکنند. برای

این کار بهتر است دام خود را به نزدیک ترین

کشتارگاه منطقه منتقل کنند یا ذبح حیوانات

در محل و تحت نظر دامپزشکان انجام

شود. گفتنی است پرهیز از مصرف گوشت و

جگر نیم پخته یا اصطلاح آبدار بسیار مهم

است. همچنین دامداران باید در صورت

مشاهده مرگ ناگهانی دام یا خروج خون از

منافذ طبیعی لاهه دام تلف شد، حتماً با

دستکش و روپوش نسبت به دفن لاشه در

پل گودال عبیق اقدام و روی آن را آهک

ضدغذوی کنند تا از گسترش آلوودگی جلوگیری

شود.

برای حل جدول اعداد باید در هر مربع کوچکتر در ۳ هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد.

همچنین هیچ عددی در یک سطر یا ستون مربع بزرگ ۹ در ۹ تکرار نشده باشد.

حل سودوکو ۳۳۷۹

سودوکو ۳۲۸۰

سودوکو ۳۲۹

سودوکو ۳۳۷۹

سودوکو ۳۴۰

سودوکو ۳۴۱

سودوکو ۳۴۲

سودوکو ۳۴۳

سودوکو ۳۴۴

سودوکو ۳۴۵

سودوکو ۳۴۶

سودوکو ۳۴۷

سودوکو ۳۴۸

سودوکو ۳۴۹

سودوکو ۳۴۱

سودوکو ۳۴۲

سودوکو ۳۴۳

سودوکو ۳۴۴

سودوکو ۳۴۵

سودوکو ۳۴۶

سودوکو ۳۴۷

سودوکو ۳۴۸

سودوکو ۳۴۹

سودوکو ۳۴۱

سودوکو ۳۴۲

سودوکو ۳۴۳

سودوکو ۳۴۴

سودوکو ۳۴۵

سودوکو ۳۴۶

سودوکو ۳۴۷

سودوکو ۳۴۸

سودوکو ۳۴۹

سودوکو ۳۴۱

سودوکو ۳۴۲

سودوکو ۳۴۳

سودوکو ۳۴۴

سودوکو ۳۴۵

سودوکو ۳۴۶

سودوکو ۳۴۷

سودوکو ۳۴۸

سودوکو ۳۴۹

سودوکو ۳۴۱