

## پیشگیری از آنفلوآنزا در مدارس

این روزها که شاهد شیوع آنفلوآنزا هستیم، حفظ سلامت عمومی در مراکز جمعی، به‌ویژه مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و... بسیار اهمیت دارد. در شرایط کنونی، بهترین راه برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی، رعایت بهداشت شخصی و تهیه مناسب در فضاهای بسته است، بهداشت شخصی شامل چند کار ساده اما مهم است که هر فردی می‌تواند برای محافظت از خود و دیگران انجام دهد. ستاره‌ها را با آب و صابون به دست و حداقل ۱۵ ثانیه بشویید تا هر امکان آن وجود ندارد. ضد عفونی‌کننده با پایه الکل استفاده کنید. دیدن این اقدامات ساده در دوران شیوع کرونا به خوبی برای همه روشن شد. علاوه بر بهداشت شخصی، استفاده صحیح و مداوم از ماسک نیز نقش بسزایی در پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی دارد. ماسک، نه فقط از ورود ویروس به بدن فرد جلوگیری می‌کند، بلکه مانع از انتشار ذرات آلوده از طریق سرفه، عطسه و صحبت می‌شود. استفاده از ماسک اقدامی مسئولانه برای حفظ سلامت جامعه و شکستن زنجیره انتقال بیماری است. یک بیماری تنفسی که برای برخی ممکن است خفیف باشد، می‌تواند برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کودکان، مسن‌ها و کسانی با سیستم ایمنی ضعیف، پیامدهای جدی و خطرناکی داشته باشد. بنابراین، همکاری مسئولیت‌ها تا از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه محافظت کنیم. در همه‌جای آموزشی مانند کلاس‌های درس که دانش‌آموزان و دانشجویان ساعات طولانی در کنار یکدیگر سپری می‌کنند، توجه به تهیه مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورت مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی، توصیه می‌شود پنجره‌ها باز گذاشته شوند تا هوا در گردش باشد. در صورتی که امکان تهیه طبیعی وجود ندارد، برگزاری کلاس‌ها به صورت منقطع و در فواصل زمانی معین، می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش تراکم ویروس کمک کند. در این روش، پس از هر جلسه تدریس، کلاس به مدت کوتاهی تعطیل و افراد به جای می‌شوند تا تهویه هوا کمک کند. پس از آن، کلاس برای جلسه بعدی آماده می‌شود. تصمیم‌گیری معلمان و استادان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار بیماری کلاس‌های درسی داشته باشد. علاوه بر آن، فراموش نکنیم که سطوحی که به‌طور مکرر در کلاس‌های درس لمس می‌شوند، مانند دستگیره‌ها، میزها، صندلی‌ها، کلیدهای برق و... به‌صورت دوره‌ای باید ضد عفونی شوند. این اقدام، به کاهش خطر انتقال ویروس‌ها از طریق تماس با سطوح آلوده کمک می‌کند. مسئولان و مدیران مدارس، باید تدابیر لازم را برای تهیه و در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی‌کننده و تجهیزات مورد نیاز برای گندزدایی را فراهم کنند. در نهایت هم باید در نظر داشته باشیم که رعایت دقیق و مستمر این کار ساده اما مهم، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری و کنترل بیماری‌های تنفسی، به ویژه آنفلوآنزا، در محیط‌های مانند مدرسه داشته باشد و از بروز عوارض جدی و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های تنفسی این فصل از سال جلوگیری کند.


 خبر

## نیمی از مردم علائم سرطان رانمی شناسند

معاون پژوهش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: کمبود آگاهی عمومی یکی از چالش‌های اصلی در پیشگیری و تشخیص زودهنگام است؛ چنان‌که حدود ۵۰ درصد مردم نمی‌توانند حتی یک علامت سرطان را نام ببرند. بنابراین، ضروری است سازمان‌های مردم‌نهاد و واحدهای روابط عمومی فعال تر عمل کنند.

به گزارش جام‌جم، کاظم زنده‌دل به برخی علائم مهم سرطان از جمله کاهش وزن، بی‌دلیل، وجود توده‌های درون‌دراک، ارسه‌های پوستی و مت‌مت خونریزی‌های غیرطبیعی اشاره و بر ضرورت مراجعه سریع مردم در صورت بروز علائم مشکوک تأکید کرد. وی با اشاره به تأثیر قابل توجه غربالگری در کشورهای پیشرفته عنوان کرد: در بسیاری از کشورها، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم تحت خدمات غربالگری قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که در ایران، به‌طور متوسط تنها ۲۰ درصد از این خدمات استفاده می‌کنند، حتی این رقم در برخی مناطق به کمتر از ۱۰ درصد نیز می‌رسد. معاون پژوهش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر ضرورت افزایش پوشش غربالگری، به نابرابری موجود در دسترسی به خدمات تشخیص و درمان در استان‌ها اشاره کرد و افزود: با وجود این‌که وضعیت ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه مطلوب‌تر است اما با توجه به منابع موجود، انتظار بیشتری از سیستم سلامت وجود دارد. زنده‌دل، آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی را شرط لازم برای کاهش آمار سرطان و افزایش اثربخشی غربالگری دانست.

## ۴ خوراکی مفید برای ریه

سیب و به‌ویژه پوست آن، حاوی آنتی‌اکسیدانی به نام کورستین است که التهاب ریه‌ها را کاهش می‌دهد.

## فلفل

**فلفل دلمه‌ای قرمز و فلفل چیلی دارای مقادیر بالایی ویتامین C هستند که سلامت ریه‌ها را بهبود می‌بخشد و التهاب را کاهش می‌دهند.**

چغندر

این خوراکی حاوی آنتی اکسیدان و خواص ضدالتهابی است که به سلامت ریه کمک می‌کند.

## بیویات

لویبیا، نخود و عدس دارای سطح بالایی از فیبر هستند که سبب عملکرد بهتر ریه شده و اثر محافظتی دارند.

# درس و مشق با آنفلوآنزا

## مدیران مدارس برای حفظ سلامت دانش آموزان

## در برابر آنفلوآنزا چه تدابیری باید بیندیشند؟

مدرسه است. به عبارت دیگر اگر برنامه‌های مدیریتی در سطوح بالا، با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان و نظارت‌گذار آموزشی همراه نشود، نمی‌تواند در جهت کاهش بیماری موثر باشد.

رئیس بخش عفونی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری می‌گوید: «اصل حضور پیدا نکردن دانش‌آموز با کوچک‌ترین علائم بیماری، ضروری‌ترین اقدامی است که خانواده‌ها و کادر آموزشی مدارس باید آن را جدی بگیرند.» دکتر طبرسی می‌افزاید: «هر دانش‌آموز، معلم یا کادر مدرسه که علائم تنفسی مانند تب، سرفه یا گلودرد دارد، باید از حضور در محیط آموزشی خودداری کند؛ تا اقدامی که مانع اصلی انتقال ویروس از فرد بیمار به جامعه بزرگ‌تر دانش‌آموزی و فرهنگ، کل جامعه می‌شود اما ضرورت استفاده از ماسک هم می‌تواند اهمیت ویژه‌ای در مدارس داشته باشد. باتوجه به جهش‌های ویروس و افزایش سرعت انتقال آن، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغی مانند کلاس، راهرو، بوفه، باید به یک روال همیشگی تبدیل شود.»

کارشناسان از تست‌وشوی منظم و صحیح دست‌ها با آب و صابون هم به عنوان راهکاری موثر برای حذف ویروس نام می‌برند. موضوعی که دکتر پوردست هم آن را کامل کرده و ادامه می‌دهد: «فراموش نکنیم که والدین نباید با خواندن اسامینوفن به کودک یا پاپین آوردن، تب را راهی مدرسه کنند. در چنین مواقعی کودک باید حداقل ۲۴ ساعت را بدون مصرف داروهای تب‌بر سپری کند تا اجازه حضور در مدرسه را داشته باشد.»

به گفته او، یکی دیگر از مسئولیت‌های مدیران مدارس، مه‌چهر کردن کلاس‌های درس به تهویه مناسب و ضرورت استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده برای وسایل مشترک و درزهاست. آموزش رعایت اصول پوشش دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه است. بدیهی است که مدیریت بحران آنفلوآنزا در محیطی مانند مدرسه و در شرایطی از یک سو به تصمیمات درست برای ادامه فعالیت حضوری مدارس در شرایط خاص مانند بیک‌های شیوع بیماری نیاز دارد از سوی دیگر مسئولان بایدنهی به بهداشت فردی در کلاس و مدرسه است.

**تعطیلی درپیک بیماری** 

به نظر دکتر طبرسی، غیرحضوری شدن مدارس در دوره اوج بیماری راهکاری موثر و اثبات شده برای کاهش سرعت انتقال است. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآوری می‌کند: «همان‌طور که در تجربه اخیر دیدیم، تعطیلی هفتۀ گذشته مدارس در زمان اوج بیماری، توانست نرخ گسترش را در همان ۴۰ درصد نگه دارد و مانع افزایش آن شود.» اقدامی که می‌تواند به سیستم بهداشت، فرصت بازبازی خودش را بدهد.

او معتقد است که طبیعتاً به دلایل آموزشی و اجتماعی، نمی‌توان مدارس را به شکل دائمی غیرحضوری پیش برد اما بهتر است که براساس پروتکل‌های ابلاغ شده وزارت بهداشت به آموزش و پرورش و تصمیم درست مسوولان، به صورت مقطعی در زمان‌های پیک بیماری، این راهکار را اجرا کنیم تا روند افزایشی ابتلا کاهش یابد. این در حالی است که دکتر پوردست نیز بر این باور است که آموزش و پرورش سطح سواد کودکان در زمینه بهداشت فردی، در تعطیلی مدارس اولویت دارد؛ چراکه تداوم روند مجازی شدن ممکن است به جای حل مشکل، باعث شود کودکان در مکان‌های دیگری مانند مراکز خرید و معرض ویروس قرار گیرند.

آسیب‌پذیر، به خصوص دانش‌آموزان می‌شود، طبیعتاً تصمیم‌گیری‌های راهبردی در قبال تداوم فعالیت مدارس و اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در این محیط‌ها، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در مدیریت و مهار این موج از همه‌گیری در سطح جامعه دارد.»

دکتر طبرسی به دستورالعمل وزارت بهداشت برای مدارس اشاره کرده و توضیح می‌دهد که این دستورالعمل، به خوبی روشن کرده است که در برابر پیک‌های بیماری، وضعیت مدارس باید به چه شکل مدیریت شود.

او ادامه می دهد: «فراموش نکنیم که رویکرد مدیریتی در این بحران نباید یکسان و کلی تگر باشد؛ بلکه تصمیم ها باید به صورت تفکیک شده و تخصصی برای هر استان گرفته شود. در چنین شرایطی، فاکتورهایی مانند شدت فعلی شیوع ویروس در یک منطقه خاص، پیش بینی زمان رسیدن به قله بیماری و میزان روند فروکش کردن آن، باید مبنای تعیین نحوه عملکرد و شیوه استخبرگی مدیران مدارس و ادارات کل آموزش و پرورش در هر استان قرار گیرد.»

## نشانه‌ها را جدی بگیرید

در حال حاضر، علاوه بر همه مسئولیت‌های قبلی کادر آموزشی مدارس، نظارت بر رعایت بهداشت فردی دانش‌آموزان و موارد ایمنی محیطی هم به فهرست مسئولیت‌های آنها اضافه شده است؛ چراکه متخصصان عفونی معتقدند فارغ از تصمیم‌گیری مدیران و آموزش و پرورش درباره نحوه فعالیت مدارس، باید در نظر داشته باشیم که مهم‌ترین لایه دفاعی در برابر انتقال ویروس، رعایت دقیق نکات بهداشت فردی و جمعی در محیط

۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از بروز علائم، قابلیت انتقال دارد و این همان عاملی است که باعث انتقال بیماری، از دانش‌آموزی به دانش‌آموز دیگر می‌شود.

آن طور که او توضیح می دهد، کودکان به طور متوسط، تا سه برابر بیشتر از بزرگسالان در شیوع ویروس نقش دارند؛ زیرا در بسیاری از موارد، رعایت نکات بهداشتی از طرف دانش آموزان به طور کامل انجام نمی شود.

## دستورالعمل‌های وزارت بهداشت

شست‌وشوی نامناسب دست‌ها، استفاده مشترک از وسایل شخصی و بی‌توجهی به علائم اولیه بیماری از عواملی است که زمینه‌گسترش سریع‌تر عفونت را در بین کودکان فراهم می‌کند. شاید به همین دلیل است که این روزها تقریباً در بیشتر خانواده‌هایی که دانش‌آموز دارند، نشانه‌هایی از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا مشاهده می‌شود.

اما آنچه اسامال اهمیت توجه به مدارس را افزایش داده، جهش های ویروس آنفلوآنزاست؛ جهش هایی که موجب تغییر رفتار ویروس شده و گروه های سنی پایین تر، به ویژه کودکان را بیشتر درگیر می کنند و طبعاً سرعت انتشار ویروس در سطح جامعه را هم به طور چشمگیری بالا می برد. در چنین شرایطی، نقش مدیران مدارس، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش در تصمیم گیری های درست و اصولی، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. موضوعی که دکتر پیام طبرسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش عفونی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری هم آن را تایید می کند و به جام جم می گوید: «باتوجه به این که ویروس فعلی، باعث درگیری بیشتر گروه های سنی استامینوفن، مدت هاست که برای کاهش تب و تسکین درد کودکان استفاده می شود. این دارو مؤثر بوده و بدون نسخه پزشک به فروش می رسد اما خوراندن مقدار زیاد آن به کودکان می تواند مضر باشد و به یک عارضه جدی سلامتی به نام «مصرف بیش از حد استامینوفن» منجر شود. در واقع نکاتی وجود دارد که باید در مورد مصرف بیش از حد استامینوفن و کودکان بدانید.

مصرف بیش از حد این دارو می‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد. برخی موقعیت‌ها ممکن است شما را دچار مشکل کند، مثلاً اگر عجله داشته باشید، ممکن است دستورالعمل‌های روی برچسب استامینوفن را اشتباه بخوانید یا آن را با دقت اندازه‌گیری نکنید. همچنین ممکن است دو دوز را با فاصله زمانی بسیار کم به کودک بدهید. این اتفاق البته ممکن است زمانی هم رخ بدهد که شما متوجه نشوید فرد دیگر قبلاً دوز دارو را به کودک داده است.

از طرف دیگر، اگر فرزند شما علائم مختلف سرماخوردگی دارد، ممکن است بخواهید استامینوفن را با داروی بدون نسخه دیگری ترکیب کنید. اگر داروی دیگر حاوی استامینوفن باشد، این کار می‌تواند به ایجاد دوز بسیار بالایی منجر شود. اما یکی دیگر از عواملی که ممکن است باعث مصرف بالای استامینوفن شود، باور

## افزایش موارد مسمومیت با اسپرولینا

رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: براساس گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ثبت عوارض دارویی، مصرف فرآورده اسپیرولینا برای لاغری با توصیه اف‌ا غیرمختص بروز عوارض شدید کبدی در کشور راداری داشت. نمونه‌های مشابه در سایر کشورها نیز مشاهده شده است. به گزارش جام‌جم، مرجان کریمی اف‌دو: در ماه‌های گذشت گزارش‌هایی در سامانه گزارش‌دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آبدی کبدی در مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاه‌های ورزشی و اف‌ا غیرمختص دریافت شده است. وی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در بریزز ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فرآورده ثبت شده است. مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مصرف بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند. رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز - آبی سرشار از ویتامین‌ها و اسیدهای معدنی، اتنی کسیدان‌ها و پروتئین است اما مصرف بیش از حد آن می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد. وی با بیان این‌که احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، عنوان کرد: گرچه خود جلبک سمی نیست آلودگی‌هایی با سیانوتوکسین‌ها، فلزات سنگین، آفتکش یا هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای و سمومی مانند سم میکروسستین و هیانتوکسین می‌تواند به مسمومیت آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانی‌مدت مانند آلزایمر و پارکینسون منجر شود. کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانیین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی به شوک آنافیلاکسی بینجامد.

## ایستگاه سلامت

## ایستگاه سلامت