

وقتی عضلات زیادی کش می‌آیند!



دکتر پیرهام پارسانزاد

فیزیوتراپیست

کشیدگی عضلانی، آسیبی است که در آن بافت‌هایی که عضله را به استخوان وصل می‌کنند دچار آسیب می‌شوند. کشیدگی عضله نباید با پیچ‌خوردگی رباط‌ها اشتباه شود. پیچ‌خوردگی معمولاً رباط‌هایی را درگیر می‌کند که دو استخوان را به هم وصل می‌کنند و با تاندون و عضله ارتباطی ندارد. استفاده از یخ و بانداز فشاری و استراحت برای پیشگیری از تورم و التهاب بیشتر اولین اقدامات درمانی بوده و بعد از آن فیزیوتراپی می‌تواند آغاز شود.

فیزیوتراپی به‌طور قطع موارد خفیف را بهبود بخشیده و در موارد شدید ممکن است درمان‌های جراحی و ترمیمی لازم شود. نسبت به‌شدت آسیب، علائم بیمار هم متفاوت خواهد بود.

درد و حساسیت شدید به لمس، قرمزی و کبودی، محدودیت حرکات مفاصل، اسپاسم و گرفتگی عضلات، تورم و ضعف عضلانی از مهم‌ترین علائم کشیدگی عضله و تاندون است. اگر با وجود انجام درمان‌های ذکر شده، علائم بیمار تشدید شد، به‌خصوص این‌که بیمار درد غیرقابل

تحمل داشت و کرخی و سوزن‌سوزن شدن احساس کرد، متوجه می‌شویم که آسیب جدی است و باید از روش‌های تشخیصی همچون ام‌آرآی و سونوگرافی سود جست.

کشیدگی‌های حاد عضلانی ممکن است ناشی از حرکاتی همچون بلند کردن اجسام سنگین در وضعیت‌های مناسب بروز یابد، اما کشیدگی‌های مزمن عضلانی می‌تواند در اثر آسیب‌های مکرر ایجاد شود، زمانی‌که شما فشار زیادی بر عضله خود وارد می‌کنید و یک حرکت خاص را بارها و بارها تکرار می‌کنید، پرداختن به ورزش‌های پرتنشی همچون فوتبال، بوکس، کشتی و... می‌تواند خطر دچار شدن به کشیدگی عضله را دوچندان کند. بخش‌های خاصی از بدن در انجام ورزش‌های مذکور بیشتر در معرض خطر کشیدگی عضلانی هستند. آرنج‌ها هم در ورزش‌های پرتابی و راکتی آسیب‌پذیرترند. انجام مرتب تمرینات کششی و تقویتی تحت نظر یک فیزیوتراپیست، آمادگی جسمانی و فعالیت‌های شغلی به عنوان بخشی از برنامه ورزشی می‌تواند خطر بروز کشیدگی عضلانی را کاهش دهد. گرم کردن قبل از ورزش می‌تواند خطر بروز پارگی عضلات را کاهش دهد.



پیشگیری از زوال عقل با داروی قلبی!

محققان دریافتند داروهای مورد استفاده در درمان بیماری قلبی و آنژین می‌تواند از زوال عقل و سکنه پیشگیری کنند. محققان دانشگاه ادینبرگ بریتانیا دریافتند دو داروی cilostazol و isosorbide mononitrate که برای درمان بیماری قلبی و آنژین مصرف می‌شوند، در آزمایش اولیه پیشگیری

ندانه‌پری سلامت

طبق آمارهای جهانی، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت جهان نابارور هستند. تا سال‌ها قبل که درمان‌های ناباروری پیشرفت نکرده بود، بسیاری از زوجین از پدر و مادر شدن ناامید می‌شدند اما با گسترش دانش بشر، این سد شکسته شد و حالا حدود نیمی از آنها طعم شیرین پدر و مادر بودن را تجربه می‌کنند. در این میان، دکتر محمدرضا صادقی، متخصص جنین‌شناس پژوهشگاه ابن سینا معتقد است در بررسی‌هایی که در ایران و از سوی پژوهشگاه صورت گرفته، میزان شیوع ناباروری در ایران ۱۵ تا ۲۰ درصد و در تهران و البرز به ۲۰ درصد می‌رسد که بخشی از آن به بالاتر رفتن سن ازدواج برمی‌گردد. او در ادامه، به بررسی این موضوع و دسته‌بندی روش‌های درمان ناباروری می‌پردازد.

اندام‌های تولیدمثلی هم مانند دیگر اندام‌های بدن در معرض آسیب هستند و این آسیب، شامل عوامل محیطی، رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان و آلودگی‌ها می‌شود که هر چه سن بالاتر می‌رود، احتمال ناباروری بیشتر شده و سیستم فیزیولوژی بدن هم فعالیت خود را از دست می‌دهد؛ به‌عنوان مثال، در خانم‌ها رسیدن به دوران یائسگی فرآیند تولیدمثل و باروری را دچار مشکل می‌کند.

درمان ارزان‌تر نسبت به منطقه

در تهران حدود ۵۰ مرکز درمان ناباروری وجود دارد. با توجه به حمایت‌هایی که از این درمان‌ها در داخل کشور می‌شود و ارائه

از سکنه و زوال عقل ناشی از آسیب به عروق ریز خونی مغز امیدوارکننده بودند. آسیب به عروق خونی کوچک مغز عامل حدود یک چهارم از سکنه‌های مغزی و نیز شیوع مشکلات حافظه و زوال عقل نیست. ایزت، درحال حاضر تنها راه کاهش ریسک بیماری، کنترل فشارخون و کلسترول، ترک سیگار و کنترل

درمان‌های ناباروری را به تاخیر نیندازید

اگر بالای ۳۰ سال دارید، بعد از یک سال تلاش بی‌نتیجه برای بچه‌دار شدن باید به پزشك مراجعه كنید



هر درمانی جای خودش را دارد

هیچ‌گاه یک روش درمانی را نمی‌توان برای همه افراد توصیه کنیم. بلکه با در نظر گرفتن مشکلی که هر زوج دارد، هر روشی می‌تواند بهترین درمان برای آنها محسوب شود. از ساده‌ترین روش‌ها، اگر زوجین جوان بوده و مشکلی جدی نداشته باشند، تنها با تحريك دارویی، تخمدان‌های خانم را فعال کرده و با دارو کیفیت و حرکت اسپرم‌ها را در آقا بالا می‌برند و به آنها توصیه می‌شود به‌طور طبیعی برای بچه‌دار شدن تلاش کنند. اما گاهی در مرحله بعد، این زمان طولانی شده و فرصت زیادی هم ندارند، نمونه اسپرم همسر گرفته، شست‌وشو داده و آماده می‌شود و تخمک‌های خانم هم مهیا و اسپرم‌های انتخاب‌شده را به داخل رحم زن تزریق می‌کنند که به آن روش IUI گفته می‌شود.

در مواردی که مشکل جدی‌تر بوده و تعداد اسپرم کم یا وضعیت تخمک نامناسب باشد، از روش لقاح خارج‌رحمی استفاده می‌شود؛ به این معنا که تخمک خانم از بدن خارج شده، اسپرم همسر را هم می‌گیرند و لقاح در داخل دستگاهی که شبیه شرایط رحم مادر طراحی شده، صورت می‌گیرد و جنین به مدت سه تا پنج روز نگهداری و داخل انکوباتورها کشت داده می‌شود و یک یا دو جنین از بین جنین‌هایی که کیفیت رشد عالی دارند، انتخاب

فرصت را از دست ندهید


مکث

در تعریف جهانی ناباروری، وقتی خانم و آقا زیر ۳۵ سال دارند و تصمیم به بچه‌دار شدن گرفته‌اند و از هیچ‌کدام از روش‌های پیشگیری استفاده نکنند، اگر طی یک سال مداوم و در ۱۲ سیکل پی‌درپی برای بچه‌دار شدن تلاش کنند ولی موفق به بارداری نشوند، به این زوج نابارور اطلاق می‌شود. بنابراین، اگر زوجی بعد از یک ماه ازدواج، برای بچه‌دار شدن تلاش کردند و بچه‌دار نشدند، نمی‌توان کلمه نابارور را برای آنها تعریف کرد. حتی در زوجین زیر ۳۰ سال، بین ۱۸ تا ۲۰ ماه هم می‌توانند بدون مراجعه به پزشك برای بچه‌دار شدن تلاش کنند و در صورت باردار نشدن خانم، به پزشك مراجعه کنند. طبق این زمان‌بندی‌ها، در یک سال اول، ۸۵ درصد زوجین صاحب فرزند می‌شوند. ۱۵ درصد زوجین باقی می‌مانند و اگر این یک سال فرصت به دو سال افزایش یابد، ۵ درصد دیگر از زوجین صاحب فرزند می‌شوند، ۱۰ درصد باقی‌مانده اگر بالای ۳۰ سال دارند، بعد از یک سال تلاش، باید به پزشك مراجعه کنند و زمان را از دست ندهند. این افراد در مراحل که علت سطحی داشته باشند، ابتدا با استفاده از درمان‌های دارویی و جراحی درمان می‌شوند و به آنها فرصت داده می‌شود و چنانچه فرصتی برای بچه‌دار شدن نداشته باشند، وارد فاز استفاده از روش‌های کمک‌باروری می‌شویم که با توجه به علت ناباروری، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود.

خیلی خوبی هم به‌دنبال دارد. این روش‌ها، روش‌های معمول درمان ناباروری در دنیا هستند، اما یکی از خاص‌ترین روش‌هایی که در حال حاضر در ایران هم صورت می‌گیرد، کمک به زوجینی است که سابقه بیماری ژنتیکی داشته و فرزندان با معلولیت‌های جسمی یا مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی به دنیا می‌آورند. در این روش، می‌توان بیماری ژنتیکی را در والدین تشخیص داد. می‌توان در جنینی که از لقاح خارج‌رحمی ایجاد شده در همان دو، سه روز اول بیماری ژنتیکی را تشخیص داد و از بین جنین‌های تشکیل شده، جنین‌های سالم و عاری از بیماری ژنتیکی را در داخل رحم کاشت. این روش به والدین کمک می‌کند تا فرزندان سالمی داشته باشند.

کلینیک درد

درمان دیسك كم‌،سیاه و سفید نیست



برای آنها تا در صورتی که دیسك آنها با روش‌های كم‌تهاجم قابل درمان باشد بتوانند از آن بهره‌مند شوند. این روش‌ها در اتاق عمل مجهز به فلوروسکوپ و توسط پزشك فوق‌تخصص درد انجام‌پذیر است. با توجه به این‌که در این روش‌ها نیاز به بیهوشی یا برش جراحی نیست عوارض جراحی باز وجود نخواهد داشت. در بیش از دوسوم بیماران مبتلا به دیسك كم‌ر انجام این تکنیک‌ها می‌تواند سبب ایجاد درمان بیماری دیسك و گریز از جراحی باز كم‌ر شود. انجام این عمل‌ها سرپایی است و بیماران يك ساعت پس از عمل مرخص شده و در طول يك تا دو هفته بعد فعالیت‌های روزانه را از سر می‌گیرند.

در ستون کلینیک درد در هفته‌های آینده به تفصیل به روش‌های مختلفی که از آنها در درمان دیسك به صورت كم‌تهاجمی استفاده می‌شود، خواهیم پرداخت.



دکتر مجید حیدریان

فوق تخصص درد

کم‌درد شایع‌ترین بیماری پس از سرماخوردگی و دیسك كم‌ر شایع‌ترین علت ایجاد کم‌درد است. کمتر از دو دهه قبل، زمانی که هنوز کلینیک‌های درد پا به عرصه درمان نگذاشته بودند، بیماران مبتلا به دیسك كم‌ر به دو طیف سفید و سیاه طبقه‌بندی می‌شدند: یا دیسك‌های خفیفی داشتند که درمان‌های ساده آنها را به زندگی عادی برمی‌گرداند یا شدت دیسك آنقدر زیاد بود که مجبور می‌شدند تن به تیغ جراح داده و عمل جراحی انجام دهند. شاید به جرات بتوان گفت در بیش از نیمی مبتلایان به دیسك كم‌ر نه آن قدر شدت دیسك زیاد است که جراحی شوند و نه آن قدر کم است که بتوانند فعالیت‌های عادی روزانه‌شان را داشته باشند. این بیماران در طیف خاکستری درمان بین محدوده سیاه و سفید هستند. با شروع به کار کلینیک‌های درد روش‌های درمانی به نام عمل‌های مداخله‌ای یا کم‌تهاجم یا اصطلا‌حاً اینترونشن مطرح شد. عمل کم‌تهاجم در مورد دیسك روشی است که توسط آن بدون نیاز به برش پوست و با انجام بی‌حسی موضعی در حالی‌که ستون فقرات با کمک دستگاه تصویربرداری به نام فلوروسکوپ دیده می‌شود قطعه‌ای از دیسك که دچار بیرون‌زدگی شده با انرژی حرارتی لیزر یا آراف یا ترکیب شیمیایی ازون یا دیسک‌کوزل دچار تغییراتی شود تا در نهایت بیرون‌زدگی یافتد دیسك درمان شده و فشار از روی عصب سیاتیک برداشته شود. انجام عمل‌های بسته انقلابی را در درمان دیسك‌های كم‌ر ایجاد کرده و مراجعه مبتلایان به کم‌درد به کلینیک‌های درد می‌تواند فرصتی باشد